

Injektionslösung

Adrenalin «Bichsel»

0.1mg/ml, 10 Ampullen à 10 ml

0.5mg/ml, 10 Ampullen à 5 ml



Pharma **bichsel**

Adrenalin «Bichsel» 0.1 mg/ml, 0.5 mg/ml

Zusammensetzung

Wirkstoff: Adrenalinum (ut adrenalini tartras).

Hilfsstoffe:

Adrenalin «Bichsel» 0.1 mg/ml

Natrii chloridum, natrii metabisulfis (E223) 0.1 mg/ml, acidum hydrochloridum, aqua ad iniectionabile.

Adrenalin «Bichsel» 0.5 mg/ml

Natrii chloridum, natrii metabisulfis (E223) 0.25 mg/ml, acidum hydrochloridum, aqua ad iniectionabile.

Darreichungsform und Wirkstoffmenge pro Einheit

Adrenalin «Bichsel» 0.1 mg/ml Injektionslösung (i.v.)

1 ml enthält adrenalinum 0.1 mg (ut adrenalini tartras).

1 Ampulle zu 10 ml enthält: adrenalinum 1 mg (ut adrenalini tartras).

Adrenalin «Bichsel» 0.5 mg/ml Injektionslösung (s.c.)

1 ml enthält adrenalinum 0.5 mg (ut adrenalini tartras).

1 Ampulle zu 5 ml enthält: adrenalinum 2.5 mg (ut adrenalini tartras).

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten

Subkutane Injektion von Adrenalin 0.5 mg/ml: Anaphylaktische Reaktionen.

Intravenöse Injektion von Adrenalin 0.1 mg/ml: Schwere anaphylaktische Reaktionen (Schock, Bronchospasmus, Glottisödem), kardiopulmonale Reanimation (bei Herz-Kreislauf-Stillstand).

Dosierung/Anwendung

0.5 mg/ml: zur subkutanen Injektion

Anaphylaktische Reaktionen

Erwachsene: 0.1 bis 0.5 mg Adrenalin s.c., max. 1 mg.

Wiederholung der Dosis gegebenenfalls alle 10 bis 15 Minuten, je nach Wirkung und Zustand des Patienten.

Kinder und Jugendliche: 0.01 mg/kg Körpergewicht s.c. max. 0.5 mg.

Wiederholungen der Dosis gegebenenfalls nach 20 Minuten und weiter in vierstündigen Intervallen, je nach Wirkung und Zustand des Patienten.

0.1 mg/ml: zur intravenösen Injektion

Schwere anaphylaktische Reaktionen

Erwachsene: initial 0.05 bis 0.1 mg i.v.

Wiederholung der Dosis gegebenenfalls alle 3 bis 5 Minuten, je nach Wirkung und Zustand des Patienten.

Kinder und Jugendliche: initial 0.01 mg/10 kg Körpergewicht i.v.

Wiederholung der Dosis gegebenenfalls alle 3 bis 5 Minuten, je nach Wirkung und Zustand des Patienten.

Kardiopulmonale Reanimation

Erwachsene: initial 1 mg i.v.

Wiederholung der Dosis gegebenenfalls alle 3 bis 5 Minuten, je nach Dauer der Reanimation.

Kinder und Jugendliche: initial 0.01 mg/kg Körpergewicht i.v.

Wiederholung der Dosis gegebenenfalls alle 3 bis 5 Minuten, je nach Dauer der Reanimation. Um bei Kreislaufstillstand das Einspülen in den Kreislauf zu gewährleisten, muss nach der Injektion eine i.v. Infusion angelegt werden.

Eigenschaften/Wirkungen

ATC-Code C01CA24

Wirkungsmechanismus / Pharmakodynamik

Adrenalin ist ein direkt wirkendes Sympathomimetikum mit Wirkung auf α - und β -Adrenozeptoren. Nach parenteraler Verabreichung von Adrenalin kommt es zu einem Anstieg des Blutdruckes und einer Erhöhung des Herzminutenvolumens und der Herzfrequenz. Adrenalin führt zu einer Relaxation der glatten Muskulatur der Bronchien und des Verdauungstraktes.

Zulassungsinhaber

Laboratorium Dr. G. Bichsel AG, 3800 Unterseen

Packungen

Adrenalin «Bichsel» 0.1 mg/ml:

10 Ampulle zu 10 ml (Abgabekategorie B)

Adrenalin «Bichsel» 0.5 mg/ml:

10 Ampulle zu 5 ml (Abgabekategorie B)

Ausführliche Informationen zum Produkt entnehmen Sie bitte der publizierten Arzneimittelinformation unter compendium.ch