

Solution injectable

Adrénaline «Bichsel»

0,1mg/ml, 10 ampoules à 10 ml

0,5mg/ml, 10 ampoules à 5 ml



Pharma bichsel

Adrénaline «Bichsel» 0,1 mg/ml, 0,5 mg/ml

Composition

Principes actifs : Adrenalinum (ut adrenalini tartras).

Excipients :

Adrénaline «Bichsel» 0,1 mg/ml

Natrii chloridum, natrii metabisulfis (E223) 0,1 mg/ml, acidum hydrochloridum, aqua ad iniectionabile.

Adrénaline «Bichsel» 0,5 mg/ml

Natrii chloridum, natrii metabisulfis (E223) 0,25 mg/ml, acidum hydrochloridum, aqua ad iniectionabile.

Forme pharmaceutique et quantité de principe actif par unité

Adrénaline «Bichsel» 0,1 mg/ml solution injectable (i.v.)

1 ml contient adrenalinum 0,1 mg (ut adrenalini tartras).

1 ampoule de 10 ml contient: adrenalinum 1 mg (ut adrenalini tartras).

Adrénaline «Bichsel» 0,5 mg/ml solution injectable (s.c.)

1 ml contient adrenalinum 0,5 mg (ut adrenalini tartras).

1 ampoule de 5 ml contient: adrenalinum 2,5 mg (ut adrenalini tartras).

Indications/Possibilités d'emploi

Injection sous-cutanée d'adrénaline 0,5 mg/ml : réactions anaphylactiques.

Injection intraveineuse d'adrénaline 0,1 mg/ml : réactions anaphylactiques graves (choc, bronchospasme, œdème de la glotte), réanimation cardio-pulmonaire (en cas d'arrêt cardiaque).

Posologie/Mode d'emploi

0,5 mg/ml : injection sous-cutanée

Réactions anaphylactiques

Adultes : 0,1 à 0,5 mg d'adrénaline s.c.

Le cas échéant, répéter cette dose toutes les 10 à 15 minutes, selon l'effet et l'état du patient.

Enfants et adolescents : 0,01 mg/kg de poids corporel s.c. max. 0,5 mg.

Le cas échéant, répéter cette dose après 20 minutes et ensuite toutes les 4 heures, selon l'effet et l'état du patient.

0,1 mg/ml : injection intraveineuse

Réactions anaphylactiques sévères

Adultes : initialement 0,05 à 0,1 mg i.v.

Si nécessaire, répéter la dose toutes les 3 à 5 minutes selon l'effet et l'état du patient.

Enfants et adolescents : initialement 0,01 mg/10 kg de poids corporel i.v.

Le cas échéant, répéter cette dose toutes les 3 à 5 minutes selon l'effet et l'état du patient.

Réanimation cardiopulmonaire

Adultes : initialement 1 mg i.v. (corresp. 10 ml solution injectable 0,1 mg/ml).

Le cas échéant, répéter cette dose toutes les 3 à 5 minutes selon la durée de la réanimation.

Enfants et adolescents : initialement 0,01 mg/kg de poids corporel i.v. (corresp. 0,1 ml/kg de poids corporel solution injectable 0,1 mg/ml).

Le cas échéant, répéter cette dose toutes les 3 à 5 minutes selon la durée de la réanimation. En cas d'arrêt de la circulation, après l'injection initiale, la répartition régulière dans la circulation doit être assurée par l'instauration d'une perfusion i.v.

Propriétés/Effets

Code ATC C01CA24

Mécanisme d'action/Pharmacodynamique

L'adrénaline est un sympathomimétique qui agit directement sur les récepteurs α - et β adrénergiques. Après administration parentérale, l'adrénaline, il y a une augmentation de la tension artérielle, du débit cardiaque et de la fréquence cardiaque. L'adrénaline entraîne une relaxation de la musculature lisse des bronches et du tube digestif.

Titulaire de l'autorisation

Laboratorium Dr. G. Bichsel AG, 3800 Unterseen

Emballage

Adrénaline «Bichsel» 0.1 mg/ml :

10 ampoules de 10 ml (catégorie de remise B)

Adrénaline «Bichsel» 0.5 mg/ml :

10 ampoules de 5 ml (catégorie de remise B)

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez consultez les informations sur le médicament publiée dans le compendium.ch